

Növénygondozási útmutatók

Anyósnyelv/*Sansevieria sp.*



Elhelyezés: napos, világos és félárnyékos helyen is tartható. Árnyékosabb helyre, a nem csikos változatokat válasszuk.

Öntözés: elég csak mértékkel öntözni, nyugodtan hagyjuk kiszáradni a föld felszínét.

Párásítás: jól bírja a

szárazabb levegőt is, nem szükséges párásítani.

Tápoldatozás: nyáron 2-3 hetente tápoldatozhatjuk, a többi évszakban elhagyható a tápoldatozás.

Átültetés: évente érdemes átültetni B virágföldbe.

Areca pálma/*Areca lutescens*



Elhelyezés: napos, világos, átlagos hőmérsékletű helyen érzi legjobban magát.

Öntözés: átlagos vízigényű növény, rendszeres öntözést igényel, de túlóntozni, nem kell.

Párásítás: szereti a párás környezetet, ezért érdemes a

leveleit vízzel permetezni.

Tápoldatozás: rendszeres tápoldatozást igényel.

Átültetés: ha szükségessé válik az átültetés, tavasszal palma virágföldbe ültessük át.

Bambuszpálma/*Chamaedorea*



Elhelyezés: a világos, vagy félárnyékos, szobahőmérsékletű, nem huzatos helyet kedveli.

Öntözés: vízigényes növény, földje legyen nedves, ne hagyjuk kiszáradni a földlabdáját, de ne is álljon a vízben.

Tápoldatozás: tavasztól

-őszig háromhetente tápoldatozhatjuk, ősszel és télen elhagyható a tápoldatozás.

Párásítás: szereti a párás levegőt, a levelek vízzel való permetezése, biztosítja a megfelelő páratartalmat.

Átültetés: átültetni tavasszal lehet B virágföldbe, ha már elhasználódott a földje, vagy túl kicsi a cserepe.

Borsarc/*Peperomia sp.*



Elhelyezés: a sima zöld levelű változatok világos, vagy félárnyékos, a színes levelűek világos helyre ideálisak.

Öntözés: mértékkel öntözzük, télen pedig, csak egészen kevés vizet adjunk neki. A nyirkos, hideg föld, rothadást okozhat.

Tápoldatozás: tavasszal és nyáron háromhetente tápoldatozhatjuk.

Párásítás: a vékonyabb levelű fajok igénylik a párásítást, a vastagabb levelűek a száraz levegőt is bírják.

Átültetés: tavasszal és nyáron is át lehet ültetni B típusú virágföldbe.

Kártevők, betegségek: nem megfelelő gondozás esetén levélhullás, levél és szárrothadás jelentkezhet. Kártevők közül a levélfonálféreg okozhatnak gondot.

Növénygondozási útmutatók

Botpálma/*Raphis excelsa*



Elhelyezés: nem huzatos, világos vagy félárnyékos, nyáron meleg, télen hűvös helyen tartható.

Öntözés: tavasszal és nyáron bőségesen, télen ritkábban öntözzük.

Tápoldatozás: tavasz végén és nyáron, kis adag tápoldattal

tápoldatozzuk.

Párásítás: időnként permetezzük a leveleket vízzel, így biztosítható a kellő páratartalom.

Átültetés: ha kinőtte a cserepét, akkor T típusú földbe, vagy homokkal kevert kerti földbe ültessük.

Betegségek, kártevők: száraz és meleg környezetben takácsatka, a levelek száradása és barnulása.

Flamingóvirág/*Anthurium*



Elhelyezés: a félárnyékos, vagy világos, kellemesen meleg helyet kedveli, a tűző naptól óvjuk.

Öntözés: télen mérsékeljük az öntözést, tavasztól őszig rendszeresen öntözzük lágy vízzel. Vízzel soha ne álljon alatta.

Párásítás: Kedveli a párás környezetet. A párásítás során, a virágokra ne kerüljön a kipermetezett vízből, mert barna foltok jelenhetnek meg rajtuk.

Betegségek, kártevők: napos, száraz levegőjű helyen, a takácsatkák támadhatják meg, a levelek széle pedig besodródik. Levéltetvek és pajzstetvek szintén károsíthatják. Betegségek közül a gyökérrothadás és a levélfoltosság fordulhat elő.

Dracéna/*Dracaena sp.*



Elhelyezés: világos, esetleg félárnyékos helyen tartjuk, tűző napra ne tegyük.


Öntözés: öntözzük, rendszeresen, de mértékkel, ne hagyjuk, hogy a földje teljesen kiszáradjon, de ne is álljon a vízben.

Tápoldatozás: tavasszal és nyáron kéthetente tápoldatozzuk, ősztől elhagyhatjuk a tápoldatozást.

Párásítás: a száraz levegőt nem kedveli, ez pl. a fűtési szezonban jelenthet problémát. Gondoskodjunk párásításról.

Átültetés: elég kb. 2 évente átültetni, ehhez B virágföldet választunk.

Fokföldi ibolya/*Saintpaulia*



Elhelyezés: a világos, nem tűző napos, kellemesen meleg helyet kedveli. Télen a 16 fok körüli hőmérséklet az ideális. A hirtelen hőmérsékletváltozást és huzatot nem szereti.

Öntözés: földjét tartjuk nedvesen, az öntözések között a föld felszínét, hagyjuk kicsit

kiszáradni. Szobahőmérsékletű vizet használunk, az öntözővíz ne érje a leveleket, csak a talajt.

Párásítás: kedveli a párás levegőt, ennek biztosítására, állítsuk nedves kavicsrétegre a cserepet.

Betegségek, kártevők: a levéltetvekre és a viaszos tetvekre is érzékeny. Túlöntözés esetén tőrothadás jelentkezhet, a tűző nap, a levelek sárga foltos elszíneződését eredményezi. Lisztharmat vagy botritisz is jelentkezhet, ezt a penészes levelek és virágok jelzik.

Fikuszok / *Ficus sp.*



Elhelyezés, hőmérséklet: a szélsőséges körülményeket nem szereti (erős napsütés, túl meleg és túl száraz levegő, túl hideg és nedves környezet, huzat). Huzatos helyen ledobhatja leveleit.

Öntözés: Közepes vízigényű szobanövény, a nyári

melegebb időszakban, legalább 4 naponta kapjon vizet, télen ennél ritkábban. Ne öntözzük túl, a pangó víz ártalmas, és levélhullást okoz.

Párásítás: páraigénye átlagos, ezért érdemes párásítani. A párásításra jó módszer a közvetlen párásítás, azaz a levelek vízzel való permetezése.

Tápanyagot: meghálálja a rendszeres tápanyagot, nyáron kéthetente adjunk neki tápanyagot.

Átültetés: Ha szükségesnek látjuk az átültetést, mert már kicsi lett a növény cserepe, vagy kimerült és elhasználódott a növény földje, akkor tavasszal B típusú virágföldbe ültethetjük át.

Metszés: a fikuszokat metszéssel alakíthatjuk, különösen jól alakítható a *Ficus microcarpa*, a kislevelű fikusz (*Ficus benjamina*), és a hosszúlevelű fikusz (*Ficus longifolia*).

Munka előtt érdemes kesztyűt húzni, és leteríteni a növény alatt a padlót, a csepegő tejnedv miatt. Egy-egy ágat vagy töből vágjunk le vagy egy levélnél metsszük el.

Érdemes letről felfelé haladva végezni a metszést. Ha ezzel végeztünk forgassuk meg a növényt, vagy részletenként haladjunk körbe.

Betegségek, kártevők: száraz levegőjű, fűtött helyiségben takácsatkák, pajzstetvek és tripszek is megtámadhatják.

Huzatos helyen, valamint túllöntözés hatására is hullajthatja leveleit. Ha télen túl hűvös és hideg helyen tartjuk szintén ledobhatja a leveleit.

Kenciapálma / *Howeia forsterana*



Elhelyezés: világos, vagy félsárnyékos meleg, állandó hőmérsékletű helyen tartasuk.

Öntözés: földjét tartasuk mindig nedvesen, azonban a túllöntözéstől óvakodni kell, mert rohadni kezd a növény.

Tápanyagot: tavasszal és nyáron, kéthetente mérsékelt töménységű

tápanyaggal tápanyagot.

Párásítás: kedveli a párás környezetet, gyakran párásítsunk, különösen télen.

Átültetés: C típusú virágföldbe történik, elég akkor átültetni, ha kinötte a cserepét.

Kártevők, betegségek: száraz levegőjű helyen pajzstetvek és takácsatkák támadhatják meg. Túllöntözés hatására rohadni kezd.

Kroton / *Codiaeum variegatum*



Elhelyezés: világos, kellemesen meleg helyet keressünk számára, ahol nincs huzat.

Öntözés: rendszeres mérsékelt öntözést igényel, télen ritkábban öntözzük.

Tápanyagot: az átültetés utáni egy hónap leteltével az

öntözővízhez tápanyagot is adhatunk.

Párásítás: igényli a párás környezetet, permetezzük leveleit vízzel, vagy a cserepét állítsuk, kavicssal és vízzel töltött tálcára.

Átültetés: tavasszal ültessük át, legalább kétfévente.

Kártevők, betegségek: kártevők és betegségek általában nem támadják meg. Fényhiányos helyen nem lesz szép a levelek színe „bezöldül”.

Növénygondozási útmutatók

Kukoricalevél/Aspidistra



Elhelyezés, hőmérséklet: jó választás sötétebb szobába is, tűző napos hely kivételével, mindenhol jól érzi magát.

Öntözés: rendszeres mérsékelt öntözést igényel, ne száradjon ki, de ne is legyen túlóntozva.

Párásítás: túlságosan száraz levegőjű helyen, a leveleken barna foltok jelennek meg, ez megelőzhető, ha a leveleket vízzel permetezzük.

Átültetés: átültetni elég 2-3 évente tavasszal, nem kell túl mélyre ültetni.

Kúszó filodendron/Philodendron scandens



Elhelyezés: átlagos szobahőmérsékletű, árnyékos, félárnyékos és világos helyre is ideális.

Párásítás: főként a téli fűtési időszakban, érdekes leveleinek permetezésével párásítani.

Öntözés: rendszeresen öntözzük tavasztól ősziig, de ne öntözzük

túl. Télen kevesebbet öntözzük, a föld felszínét hagyjuk kicsit kiszáradni.

Tápoldatozás: tápoldatozni csak tavasszal, és nyáron szükséges kéthetente.

Egyéb teendők: rendszeresen vágjuk vissza a felesleges hajtásokat. Az elhalt növényi részeket, és leveleket is mindig távolítsuk el.

Átültetés: Az idős példányokat, akkor szükséges átültetni, ha kinőtték a cserepet. A fiatal növények átültetésére tavasszal kerülhet sor, tőzeg alapú vagy agyagos virágföldbe.

Nyillevél/ Syngonium podophyllum



Elhelyezés: az egyszínű zöld levelű változat, világos, vagy félárnyékos, a mintás levelű, világos, kellemesen meleg helyre ideális.

Öntözés: szobahőmérsékletű, lágy vízzel öntözzük, földjét tartsuk, mindig kissé nedvesen.

Tápoldatozás: tavasszal és nyáron kéthetente adjunk neki tápoldatot

Párásítás: kedveli a párás levegőt, leveleit permetezzük vízzel, és gyakran portalanítsuk.

Átültetés: átültetni B virágföldbe lehet, elég csak akkor, ha már kicsi számára a cserep, vagy pedig a földje nagyon elhasználódott.

Lepkeorchidea/Phalaenopsis



Elhelyezés: a világos helyet kedvelik, a tűző napot viszont nem, a levelek megéghetnek, vagy vörösen elszíneződhetnek.

Öntözés: hetente egy alkalommal öntözzük lágy vízzel, annyira, hogy ne álljon alatta a víz. Az esővíz és az ioncserélt víz is megfelelő.

Párásítás: kedveli a párás környezetet. A megfelelő páratartalmat, a cserep alá helyezett tálcára szórt kavics vagy agyaggranulátum segítségével biztosíthatjuk, melyre vizet öntünk.

Tápoldatozás: rendszeresen tápoldatozzuk az öntözővízbe kevert, a gyári előírás felére, harmadára hígított tápoldattal.

Átültetés: Az orchideákat 2-3 évente kell átültetni tavasszal vagy nyáron, orchidea ültető közegbe. Virágföldbe semmiképp sem!

Növénygondozási útmutatók

Rákvirág/*Aglaonema*



Elhelyezés: árnyékos vagy félsárnyékos, szobahőmérsékletű helyen érzi jól magát.

Öntözés: vizigénye átlagos, tavasszal és nyáron gyakrabban, ősztől ritkábban öntözzük.

Tápoldatozás: nyáron, kéthetente

mérsékelt tömény tápoldattal tápoldatozzuk.

Párásítás: kedveli a párás levegőt, leveleire ne permetezzünk vizet, közvetett módon párásítsunk.

Átültetés: a fiatal növényeket évente, a nagyokat, csak ha szükséges, akkor ültessük át, tavasszal, B típusú virágföldbe.

Kártevők, betegségek: takácsatkák és pajzstetvek támadhatják meg. Levélszélei barnulni kezdenek, és növekedési problémák lépnek fel, ha földje túl hideg, illetve ha hideg és kemény az öntözéshez használt víz.

Sugárarália/*Schefflera*



Elhelyezés: a világos, vagy félsárnyékos, nem túl meleg helyet kedveli.

Öntözés: rendszeres mérsékelt öntözést igényel, ne legyen száraz a földje, de ne is álljon vízben.


Tápoldatozás: tavasszal és nyáron kéthetente tápoldatozzuk.

Párásítás: kedveli a párás levegőt, főleg meleg helyen permetezzük sűrűn vízzel.

Átültetés: a fiatal növényeket évente kell átültetni, az időseket elég szükség esetén.

Betegségek, kártevők: pajzstetvek támadhatják meg. Télen 12foknál alacsonyabb hőmérsékleten ledobhatja leveleit.

Szobai futóka/*Scindapsus aureus*



Elhelyezés: a kellemesen meleg, világos, de nem tűző napos hely a leginkább megfelelő számára.

Öntözés: vizigénye átlagos, 3-4 naponta érdemes öntözni, télen valamivel ritkábban.

Tápoldatozás: a rendszeres tápoldatozást meghálálja.

Párásítás: páratartalom igénye alacsony, nem kell külön párásítani.

Vitorlavirág/*Spathiphyllum*



Elhelyezés: félsárnyékos és világos helyen is jól érzi magát szobahőmérsékleten.

Öntözés: lágy, szobahőmérsékletű vízzel öntözzük. Vizigénye átlagos, ne hagyjuk kiszáradni, de ne is álljon a vízben. Ősszel és télen

ritkábban öntözzük.

Tápoldatozás: tavasztól-nyárig kéthetente tápoldatozzuk mérsékelt töménységű tápoldattal.

Párásítás: kedveli a párás környezetet, főként nyáron, valamint a fűtési időszakban permetezzük vízzel a leveleit.

Átültetés: ha a talaj már nagyon elhasználódott, esetleg a növény kinötte a cserepét, akkor tavasszal ültessük át B virágföldbe.

Zámia/Zamioculcas



Elhelyezés: világos, vagy félárnyékos, szobahőmérsékletű helyen érzi jól magát. A tűző nap hatására sárgulnak a levelei. A huzatot nem szereti.

Öntözés: a zámia, föld alatti gumójában sok vizet raktároz, ezért elég csak mértékkel öntözni. Ne öntözzük túl!

Tápanyagot: tavasztól-őszig kéthetente tápanyagot adjunk. Télen hagyjuk el a tápanyagot, és még kevesebbet öntözzük.

Átültetés: az átültetésre csak nagyon ritkán van szükség, akkor érdemes sort keríteni rá, ha a gyökerei már szinte kilógnak a cserépből.

A szobanövények gondozásáról, valamint szolgáltatásinkról az alábbi weboldalakon olvashat:

Céges oldalunk: <https://cityplant.hu>

Online kertészeti magazinunk: <https://citygreen.hu>

Elérhetőségeink:

Ajánlatkérés

Pentz Balázs

Cégvezető

Tel: +36 20 941 4769

Email1: info@cityplant.hu

Email2: info@hungarden.hu

Ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálat:

<https://cityplant.hu/ugyfelszolgalat>